Le médicament en ESMS

Le 22 mai 2019

Docteur Christine Palix

INTERETS POUR LE SUJET

- ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE
 - STRUCTURE MEDICO SOCIAle
 - FDV ET MAS
-

LE NEURONE

- Axone
 - Synapse
 - Vésicule synaptique
 - Métabolite actif
 - Neurotransmission entre neurones
 - Régulation
-

Régions cérébrales spécifiques

- Cortex préfrontal : attention, concentration, émotions, impulsion, obsession
 - Thalamus : vigilance
 - Hypothalamus : sommeil, appétit
 - Amygdale : peur, anxiété, panique
 - Striatum et nucléus accumbens : motivation, récompense, libido,
-

Pourquoi est ce qu'on donne un traitement

- Cible: précisez le symptôme cible
 - Auto et hétéro-agressivité verbale ou physique
 - Anxiété et angoisse,
 - Dépression
 - Trouble du sommeil
-

Raisons discutables

- Résistances au changement
 - Pas assez de personnel
 - Défaut d'organisation
 - Mauvaise orientation
-
- Toujours aller chercher le sens du symptôme...
-

Clinique : co-morbidité somatique et psychiatrique

- Épilepsie
 - Hyperactivité , déficit de l'attention
 - TOC
 - Dépistage de la douleur
 - Etiologie douleurs : dentaire, digestive, cutanée et traumatique
-

Principal argument de la prescription

- Amélioration des symptômes comportementaux
 - Baisse de la souffrance psychique
 - Amélioration de l'intégration sociale
-

Prudence....

- Pas d'étude spécifique sur ces patients
 - Pas de comparaison en double aveugle
 - Etudes courtes : quelques semaines
 - Sans tenir compte de l'âge
 - Hétérogénéité des troubles
-

LES NEUROTRANSMETTEURS

Neurotransmetteurs

- Sérotonine : impulsivité, sexualité, appétit, agressivité, sommeil
 - Noradrenaline : motivation, ralentissement, énergie et l'attention
 - Les 2 : tristesse, anxiété, douleur psychique et physique, irritabilité et les troubles cognitifs.
-

Le système dopaminergique

La Dopamine est un neurotransmetteur impliqué dans des processus complexes :

- L'intention
 - l'attention
 - la motivation
 - perception d'autrui
 - contrôle des fonctions motrices : stéréotypies, agressivité et hyperactivité
-

PRINCIPALES VOIES DOPAMINERGIQUES

Le système sérotoninergique

- Régulation du sommeil
 - De l'appétit
 - De l'humeur
 - Dépression
 - Anxiété
-

VOIES SEROTONINERGIQUES

LES PSYCHOTROPES

Le choix d'un psychotrope

- Antipsychotiques atypiques ou de 2^{ème} génération
 - Neuroleptiques ou de 1^{ère} génération
 - Efficacité
 - Tolérance
 - Indications
 - Symptômes cibles
-

Choix d'un antipsychotique atypique ou de 2^{ème} génération

- Conférence de consensus (autres pathologies psychiatriques)
 - Recommandations
 - Utilisation en première intention
 - En monothérapie
 - Sans médicaments correcteurs
-

Enquête de prescriptions

- 10 ans 60 Autistes adultes hospitalisés
 - Baisse des co-prescriptions de neuroleptiques sédatifs ou incisifs, des normo-thymiques, des anxiolytiques, des hypnotiques et des antidépresseurs
 - Baisse des correcteurs du système extrapyramidal et du système nerveux central
-

Les psychotropes spécifiques d'un seul système

- L'Halopéridol : neuroleptique bloquant le système dopaminergique : antagoniste D2
 - AMM troubles graves du comportement (agitation, automutilation et stéréotypies)
 - Étudié chez les enfants autistes
 - Mais sédatif et responsable de dyskinésies aiguës et tardives, somnolence, bouche sèche...
 - Autres Antagonistes D2 purs Cyamémazine
-

Les psychotropes agissant sur plusieurs systèmes

- Les antipsychotiques atypiques : antagoniste 5 HT 2A.
 - Antagoniste sérotonine et dopamine D2
 - Efficacité sur les symptômes positifs et négatifs
 - Moins d'effets secondaires que les neuroleptiques classiques
-

Le Risperidone

- APA le plus utilisé
 - Extension d'AMM au traitement des troubles du comportement :
hétéroagressivité, automutilations,
impulsivité majeure et stéréotypies
 - Déficience mentale
 - Actuellement plus d'AMM
-

Le risperidone

- La Risperidone antagonistes des récepteurs dopaminergiques D2 et sérotoninergiques 5-HT2
 - Du fait d'une affinité sur les récepteurs 5-HT 1D amélioration des comportements répétitifs
 - Agressivité, l'anxiété, l'irritabilité et la dépression
-

La risperidone : la galénique

- Comprimé sec
 - Comprimé oro-dispersible
 - Soluté buvable
 - Injection retard 14 jours
 - Injection retard 1 mois
 - Injection retard 3 mois
-

L'olanzapine

- Amélioration dans l'hyperactivité
 - L'émoussement affectif
 - Les troubles de l'humeur
 - Les peurs
 - Les relations sociales
 - L'agressivité
-

L'olanzapine : la galénique

- Comprimé sec
 - Comprimé velotab
 - Forme injectable rapide 15mn
 - Injection retard 1 mois avec précautions d'emploi
-

La clozapine

- Hyperactivité
- Irritabilité
- Agressivité
- Réservé aux patients qui ne répondent pas aux autres traitements

Mais surveillance de la FNS

L'Aripiprazole

- Efficacité comparables aux autres
 - Peu d'effets secondaires
 - Pas d'étude chez l'autiste
 - Agoniste D2 antagoniste 5HT2A
 - Galénique forme pour l'adolescent plus faiblement dosée
 - Forme retard
-

La Quétiapine

- Dernier des antipsychotiques atypiques
 - Galénique forme LP : 1 prise par jour
 - Pas d'étude
 - Action anxiolytique
 - Pouvoir antidépresseur
-

Effets secondaires des antipsychotiques atypiques

- Prise de poids (clozapine le plus, olanzapine, rispéridone, quétiapine et aripiprazole le moins)
- Risque cardio-métabolique , dyslipidémique : certain pour la clozapine et l'olanzapine, incertain pour la rispéridone, la quétiapine , faible pour l'aripiprazole
- Diabétique : avertissement pour tous

L'acide valproïque/valproate de Na et la carbamazépine

- Double intérêt : Trouble de l'humeur et épilepsie
 - Labilité de l'humeur
 - Impulsivité, agressivité
 - Comportements répétitifs
 - Troubles des relations sociales
 - Précautions Dépakine
-

Les antidépresseurs

- Difficultés à faire le diagnostic
 - Dépression grave : diagnostic tardif, gravité des signes cliniques (anorexie..)
 - Seuil épiléptogène
 - Virage maniaque
 - Action sur l'anxiété et sur la dépression
-

Repères généraux d'indications thérapeutiques

Symptômes cibles	Classe thérapeutique	spécialités
Hyperactivité, inattention, impulsivité	APA	Risperidone Olanzapine
Intolérance aux changements Rituels Stéréotypies	APA	Risperidone Olanzapine
Agressivité Automutilations	APA Normothymique	Risperidone Olanzapine Quetiapine Valproate
Anxiété Symptômes	Anxiolytiques APA	Oxazépam Alprazolam Risperidone olanzapine

Repères généraux d'indications thérapeutiques

Classe thérapeutique	Noms spécialités	Symptômes cibles
Antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine	Fluoxétine, paroxétine, citalopram	Comportements sociaux Agressivité, irritabilité Actes compulsifs Rituels
Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrenaline	Venlafaxine	dépression
Antagonistes récepteurs dopamine	Halopéridol	Comportement sociaux Apprentissage Agressivité
D2 5HT	APA	Automutilations
Normothymique	Valproate de sodium	Fluctuation de l'humeur

En pratique

- Prescriptions rigoureuses, encadrées et surveillées
 - Efficacité, effets secondaires et interactions médicamenteuses
 - Informations sur les effets principaux
Cibles du traitement
 - Effets secondaires
-

La douleur

- Prudence chez les personnes non disantes
 - Recherche d'une douleur
 - Toute modification de comportement
 - Test thérapeutique
 - Actions de prévention
-

La question du « si besoin »

- Donné idéalement en prévention de la crise
 - Repérage antérieur de ce qui précède la crise
 - Repérage précis du symptôme cible
 - Limites en psychiatrie
 - Somatique : douleur, épilepsie...
-